

MOTHIV *diagnostic observance***7 – L'entourage est-il au courant de l'état de la personne, du point de vue de :****Séropositivité**

- le/la partenaire
- les amis proches
- la famille
- les collègues de travail

Traitement

- le/la partenaire
- les amis proches
- la famille
- les collègues de travail

8 – Les causes de non observance :

- oublier
- se demander dans l'instant si on vient de prendre le médicament ou pas
- ne pas être chez soi
- être occupé(e) à autre chose
- week-end
- effets secondaires
- vomissements
- se sentir déprimé(e)
- se trouver en présence de quelqu'un devant lequel on ne peut/veut pas les prendre
- s'endormir avant la prise
- ne pas être informé(e)
- ne pas avoir compris les informations
- Autres (précisez)

9 – Avec HAART, le (la) patient(e) prend également :

- des antidépresseurs
- des médicaments contre la nausée
- des médicaments contre la diarrhée
- des vitamines
- homéopathie
- Autre :
- un contraceptif
- du Bactrim
- un traitement pour l'Hépatite C
- de la méthadone
- du Subutex

10 – Facteurs de non observance :

- l'entourage n'est pas au courant de la séropositivité
- conflit de priorités face au traitement (qualité de vie versus contraintes)
- difficultés de gestion du temps
- influence des pairs (exemple: image négative liées à certains médicaments)
- non satisfaction des attentes, peu de bénéfices perçus
- dépression, perte de motivation

11 – Remarques (si la ou le partenaire est également sous traitement) :

- couple observo-discordant
- couple observo-concordant

12 – Actions mises en place :

.....

.....

.....

.....

13 – Résultats :

.....

.....

.....

.....